



ZAHRADNICTVÍ ANTIARIS s.r.o.

**PRODEJNA ROSTLIN
NÁVRHY A REALIZACE ZAHRAD
ÚDRŽBA ZELENĚ**

**VOŘÍŠKŮV DVŮR 548,
ČESKÉ BUDĚJOVICE 37004**

**TEL.: 723 23 52 53
602 12 51 20
777 23 52 88**

WWW.ZAHRADNICTVI-ANTIARIS.CZ E-MAIL: ANTIARIS@MYBOX.CZ



OCHRANA ROSTLIN – BROSKVONĚ, MERUŇKY

ROZŠTĚP PLODŮ PECEK

Nedostatek bóru, vyšší citlivost u raných odrůd, chladné počasí, nevhodná zálaha, nesprávně provedený hluboký řez

VRCHOLOVÁ CHLORÓZA LISTŮ

Nízký obsah železa, vysoký obsah vápníku, nebo fosforu

Přípravky: Arbofet – na broskvoně, Fytovit, Herba-feron, Tenzo Fe, Chlorofen, případně zelená skalice v dávce 0,5 – 5kg/ strom

RAKOVINNÉ ODUMÍRÁNÍ VĚTVÍ PECKOVIN – *Pseudomonas syringae*, *Valsa cincla* (Cytospora), *Valsa leucostoma* (cytospora)

Přípravky: Champion 50 WP, Kocide 2000, Kupricol 50

PADLÍ BROSKVONĚ – *Sphaerotheca pammosa*

Přípravky: Kumulus WG, Sulikol K

MONILIOVÁ HNILOBA – *Monilinia laxa* (fruchgena)

Přípravky: Baycor 25 WP – pouze pro meruňky, Horizon 250 EW, Sporgon 250 WP, Talent, Teldor 500 SC

JABLONĚ, HRUŠNĚ

HOŘKÁ SKVRNITOST

Postřiky provádíme od července na plody 4 – 6x.

Přípravky: Fertikal, Kalkolit, Kalkosol, Lamag – vápník, Kalkosan, Wuxal SUS kalcium, Wuxal Aminocal, chloridy a ledky vápníku

STRUPOVITOST JABLONÍ A HRUŠNÍ

Postřik vybíráme s ohledem na odrůdu jabloně či hrušně. Postřiky v období: 1. Rašení, 2. Před květem, 3. Po 14. dnech dle potřeby

Přípravky: Baycor 25 WP, Clarinet 20 SC, Delan 750 WDG, Dithane Neotec, Chorus 75WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG, Mythos 30 SC, Polyram WG, Score 250 EC, Syllit 65 WP, Syllit 400 SC, Thiram Granufla, Topas 100 EC, Zato 50 WG

PADLÍ

Postřiky provádíme 7 až 10 dnů před květem, do července, po 14. dnech dle potřeby

Přípravky: Delan 700 WDG – cíleně, jen forma 700 WDG, Discus, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG, Zato 50 WG

ZOBONOSKA OVOCNÁ, ZOBONOSKA JABLEČNÁ

Přípravky: Calypso 480 SC

KVĚTOPAS JABLOŇOVÝ

Postřik provádíme od fáze myšího ouška, jakmile jeden den je teplota ve 14⁰⁰ hodin vyšší než 17°C. Za chladného počasí za 14 dnů opakujeme

Přípravky: Calypso 480 SC, Talstar 10 EC, Karate Zeon 5 CS, Oleoekol

OBALÉČ JABLEČNÝ

Přípravky : Cyper 10EM a Decis Magus – jediné cíleně, Decis Flow 2,5, Dimilin 48 SC, Nurelle D, Spin Tor, Biobit XL – signalizace lapákem Detostop CP

REZ HRUŠŇOVÁ – Gymnosporangium fuscum

Postřik jalovců provedeme před kvetením hrušní, hrušně koncem léta

Přípravky: Baycor 25 WP, Delan 700WDG, Polyram WG, Score 250 EC, Talent

SVILUŠKY

Přípravky: Reldan 40 EC, Talstar 10 EC, Magus 200SC, Nissorun 10WP

MŠICE, KROMĚ VLNATKY

Přípravky: Calypso 480 SC,(Fast K, M – jen na neplodící stromy), Mospilan 20 SP, Neudosan AF, Pirimor 50 WG, Reldan 40 EC – jen jabloně. Na vlnatku nejlépe Calypso a Mospilan, ostatní účinkují málo

MERY

Přípravky: Vertimec 1,8 EC – jen pro hrušně, Nurelle D – jen pro jabloně. Pozor, nezaměnit!

RÉVA

OBALEČI

Přípravky: Decisy, Dimilin 48 SC, Isegar 25 WG, Integro, Karate Zeon 5 SC, Reldan 40 EC, Spin Tor, Telstar 10 EC

Biopřípravky: Biobit WP, Biobit XL – signalizace podle Deltastop EA a Biolatrap EA, Isonet L plus, Isonet LE – odparníky

VLNOVNÍK

Přípravky: Kumulus WG, Magus 200 SC, Omite 570 EW, Sulikol K, Sulka

Bio: Typhlodromus pyri

ČERVENÁ SPÁLA – Pseudopeziza ribis

Postřik provádíme v délce letorostů 12 – 15 cm, potom za 14 dnů

Přípravky: Dithane, Kocide, Discus, Quadris, Polyram WG, Zato 50 WG

BÍLÁ HNILOBA – Coniella diplodiella

Přípravky: Folpan 80 WG, Mythos 30 SC, Quadris, Zato 50 WG

ŠEDÁ HNILOBA – Botryotinia fuckeliana

První postřik provedeme při zapojování hroznů

Přípravky: Mythos 30 SC, Teldor 500 SC, Thiram granuflo – ke každému z těchto přípravků použít NatrinSam

PADLÍ – Erysiphe necator

První ošetření provedeme před květem, následně do velikosti bobulí hrachu. Nejprve začneme přípravky na bázi síry, následují DMI fungicidy, naposled strobiluriny. Je důležité pořadí nepřehodit a přípravky střídat

Přípravky: Bioan, Biool, Bioton, Falcon 460 EC, IQ Crystal, Quadris, Topas, Sulikol

PERENOSPORA – PLÍSEŇ – Plasmopara viticola

Dvakrát po odkvětu – dále do zaměkávání bobulí

Přípravky: Acrobat HZ, Alliette Bordeaux, Cuproxat SC, Folpan 80 WG

MALINÍK

BOTRITIDA - Přípravky: Teldor 500 SC

DIDYMELOVÉ ODUMÍRÁNÍ, FYTOPLAZMOVÁ ZAKRSLOST, RZIVOST – Pouze eko-opatření a nepřímá ochrana

ANGREŠT, RYBÍZ

PADLÍ – *Podosphaera mors-uvae*

Důležitý výběr odrůdy, je hlavní opatření proti této chorobě

Přípravky: Discus – použít před květem a po sklizni, Kumulus WG, Sulikol 750 SC, Bioan, Bioton

ANTRAKNÓZA – *Drepanopeziza*

Výběr odrůdy, přípravky: Dithane

STOUPEČKOVITÁ RZIVOST – *Cronartium ribicola*

Přípravky: Baycor 25 WP

TŘEŠNĚ, VIŠNĚ

SKVRNITOST – *Blumeriella jaapii*

Postřik provádíme nejprve 3 – 4 týdny po odkvětu, následně po 14 dnech opakovat , poslední postřik po sklizni.

Přípravky: Baycor 25 WP, Delan 700 WDG, Dithane, Syllit 65, Syllit 65 WP, Syllit 400 SC, Talent

MONILIOVÁ HNILOBA – *Monilinia laxa*

Ochranu provádíme na počátku kvetení a při dokvítání

Přípravky: Baycor 25 WP, Horizon 250 EW, Sporgon 50 WP, Talent, Teldor 500SC

MONILIOVÁ SPÁLA

Přípravky: Horizon 250 EW, Sporgon 50 WP

PÍĎALKY PODZIMNÍ

Přípravky: Agrion Delta, Cyper 10 EM, Decis Flo, Karate Zeon 5 CS, Spruzit Flussig, Biobit XL

PODKOPNÍČEK OVOCNÝ

Přípravky: Karate Zeon 5 CS

VRTULE TŘEŠŇOVÁ

Ochranu provedeme 7. až 8. den po náletu – signalizace pomocí žlutých sférických lepových desek

Přípravky: Decis Flo 2,5, Decis Mega, Decis 15 EW, dále Calypso 480SC, Mospilan, Reldan – 14 – 17 dní po náletu

Výběr vhodné odrůdy!

SKOŘÁPKATÉ OVOCE

BAKTERIÁLNÍ SKVRNITOST – *Xanthomonas arboraesens*

Přípravky: Champion 50 WP – před, nebo po odkvětu

HNĚDNUTÍ – *Gnomonia leptostyla*

Přípravky: Champion 50 WP – před, nebo po květu, ve stejném termínu zabere i Cupricol